

## Zgoda na zabieg wszczepienia implantów PermaLip

Imię i nazwisko pacjentki/pacjenta: \_\_\_\_\_

Droga Pacjentko, drogi Pacjencie,

Zdecydowałaś/zdecydowałeś się na powiększenie objętości ust przez wszczepienie silikonowych implantów PermaLip. Przed zabiegiem, lekarz omówi z Tobą możliwości i przebieg operacji. Musisz poznać typowe czynniki ryzyka, następstwa i alternatywne metody postępowania, zanim wyrazisz na niego zgodę. Ten dokument pomoże Ci się przygotować do rozmowy z lekarzem i zrozumieć tę metodę powiększania ust.

### Na czym polega zabieg?

Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym i polega on na wprowadzeniu odpowiednio ukształtowanego, sterylnego, silikonowego implantu w wargę górną i/lub dolną poprzez małe nacięcia (4-5 mm) w kącikach ust, od strony jamy ustnej. Miejsca te zaszywa się potem wchłanialnymi nićmi. Wielkość implantów dobiera lekarz po rozmowie z Tobą.

### Alternatywne metody powiększania ust

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów płynnych, do wstrzykiwania. Należy tu kwas hialuronowy (funkcjonujący pod różnymi nazwami, w zależności od firmy go produkującej), który po pewnym czasie zostaje wchłonięty, oraz trwale wypełniacze, również do wstrzyknięć, jak np. Aquamid. Zaletą jego jest to, że nie trzeba powtarzać zabiegów, a wadą, że w razie komplikacji, nie można go usunąć.

Do powiększenia ust można wykorzystać także własną tkankę: tłuszcz lub np. odpowiednio spreparowaną skórę. Wadą tych zabiegów jest konieczność dodatkowego okaleczenia związanego z pobraniem materiału do przeszczepu oraz nieprzewidywalny efekt końcowy związany z wchłanianiem się tłuszczu lub ograniczeniem ruchomości warg podczas wgajania się innych przeszczepów.

### Możliwe powikłania i działania uboczne

Żaden zabieg lekarski nie jest wolny od ryzyka! Z reguły leczenie przebiega bez komplikacji. Czasami jednak, mimo prawidłowo przeprowadzonej operacji występują objawy niepożądane, w trakcie lub po zabiegu. Należą do nich:

- Obrzęk w miejscu operowanym, który zwykle ustępuje po 2-3 tygodniach, w rzadkich przypadkach może utrzymywać się dłużej
- Uszkodzenie okolicznych naczyń objawiające się zasinieniami i krwinkami, które zwykle nie wymagają leczenia i znikają w ciągu 1-2 tygodni
- Uszkodzenie nerwów objawiające się zaburzeniami czucia warg, które są zwykle przemijające i ustępują samoistnie, w bardzo rzadkich przypadkach mogą pozostać na trwałe.
- Zakażenie w miejscu wszczepienia implantu, które w wyjątkowo rzadkich przypadkach może wymagać jego usunięcia.
- Niezadowolający efekt kosmetyczny spowodowany np. przemieszczeniem się implantu

- Ograniczenie ruchomości ust spowodowane nadmiernym tworzeniem się blizn w miejscu operowanym.
- Wystąpienie komplikacji może wymagać przeprowadzenia dodatkowego zabiegu.
- Rzadko, reakcje alergiczne na środek znieczulający lub dezynfekcyjny użyty w trakcie zabiegu, objawiające się obrzękiem, swędzeniem wysypką. Ciężkie reakcje uczuleniowe z zagrażającym życiu obrzękiem dróg oddechowych i wstrząsem są niezwykle rzadkie i wymagają leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Mogą pozostawiać trwale uszkodzenia różnych narządów

### **Przeciwwskazania do wszczepienia implantów PermaLip**

- Cięża i okres karmienia
- Ciężkie choroby ogólnoustrojowe
- Zaburzenia krzepnięcia krwi

### **Zgoda na zabieg**

Zostałam(łem) poinformowana(ny) o planowanym zabiegu. W rozmowie z lekarzem uzyskałam(łem) odpowiedź na wszystkie pytania, wyjaśniono mi sposób i przebieg leczenia i możliwe jego powikłania. Powyższe objaśnienie przeczytałam(em), zrozumiałam(łem) i wyrażam zgodę na wszczepienie implantów PermaLip.

-----  
Data i podpis pacjenta